

Omrekentabel Opioiden¹

MORFINE		FENTANYL	OXYCODON		HYDROMORFON		TRAMADOL	BUPRENORFINE
oraal	s.c./i.v.	pleister	oraal	s.c./i.v.	oraal	s.c./i.v.	oraal	pleister
mg per 24 uur	mg per 24 uur	µg per uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	mg per 24 uur	µg per uur
30	10	12	20	10	6 ²	2	150	
60	20	25	40	20	12	4	300	52,5
120	40	50	80	40	24	8	- ³	
180	60	75	120	60	36	12	-	105
240	80	100	160	80	48	16	-	- ⁴
360	120	150	240	120	72	24	-	
480	160	200	320	160	96	32	-	

¹ Bij het overgaan van het ene opioïd naar het andere (opioïdrotatie) vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equianalgetische dosis te geven

² Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden omdat de laagste dagdosering van het slow releasepreparaat 4 mg is en het middel 2x per dag moet worden gegeven

³ Hogere doseringen dan 400 mg per 24 uur worden niet geadviseerd

⁴ Hogere doseringen dan 140 µg per uur worden niet geadviseerd